

(continuación)

Desde la **semana 21** de gestación hasta el parto:



Salida de líquido o sangre por la vagina.



Dolor, ardor o molestia al orinar.



Inflamación de manos, pies o cara al levantarse y que persiste durante el día.



Fiebre y diarrea.



Contracciones uterinas antes de la fecha probable de parto.



Cuando ya ha pasado la fecha probable de parto.

Asiste puntualmente a todos los controles, completa el esquema de vacunación y sigue las recomendaciones de los profesionales de la salud.

Desde el parto y hasta 45 días después del nacimiento:

Dolor de cabeza intenso y frecuente.



Náuseas y vómito intenso (más de 3 veces al día).



Palpitaciones o aumento en la frecuencia de los latidos del corazón.



Endurecimiento o dolor en los senos.



Dificultad para respirar y lactar al bebé.



Sangrado vaginal abundante o salida de líquido con mal olor.



Dolor “bajito”, fiebre y escalofríos.




Herida del parto/cesárea enrojecida, endurecida y con calor localizado.



Síntomas de depresión: llanto frecuente, insomnio, pérdida del apetito, irritabilidad sin motivo aparente.



Cuando estás en su lugar sientes ganas de **ayudar**



EMBARAZADOS

Todos por la vida



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE SALUD

EMBARAZADOS

Todos por la vida



Signos y síntomas de alerta para mujeres gestantes

Durante el embarazo, acude inmediatamente a **cita prioritaria** o de **urgencias** si presentas uno o más de los siguientes signos y síntomas:

Desde el inicio del embarazo hasta la semana 20 de gestación:



Náuseas y vómito intenso (más de 3 veces al día).



Ardor en la boca del estómago.



Dolor, ardor o molestia al orinar.



Flujo genital abundante o de mal olor.



Manchado o sangrado vaginal.



Fiebre y diarrea.



Dificultad para respirar.

Desde la semana 21 de gestación hasta el parto:

Dolor de cabeza intenso y frecuente.



Visión borrosa o de "lucecitas".



Pitos o silbidos en los oídos.



Náuseas y vómito intenso (más de 3 veces al día).



Ardor en la boca del estómago.



Dolor abdominal intenso, tipo cólico.



Disminución de los movimientos del bebé.

