



## Anexo 5

# ESTRATEGIA MANOS LIMPIAS, ATENCIÓN SEGURA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD ACERCA DE LAS IACS Y SU RELACIÓN CON LA HIGIENE DE MANOS

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL TRABAJADOR \_\_\_\_\_

CARGO \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

La siguiente evaluación tiene como finalidad determinar el conocimiento de los trabajadores de la salud acerca de las IACS y su relación con la higiene de manos.

### INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

En las preguntas del 1 al 20 encontrará diferentes enunciados propuestos. Marque “F” para Falso y “V” para Verdadero de acuerdo a su juicio. Lea cuidadosamente antes de responder cada pregunta.

1. El término “IACS” se refiere a las iniciales para Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud.  
F  - V
2. El término “Higiene de Manos” se refiere a las actividades de limpieza de las manos sin el uso estricto de agua.  
F  - V
3. No existe relación entre la práctica de higiene de manos y la incidencia de las IACS.  
F  - V
4. La posibilidad de transmisión de un microorganismo a otro paciente por el personal de salud es lo que se denomina infección cruzada  
F  - V
5. Agente antiséptico es aquella sustancia antimicrobiana que se aplica a la piel para reducir el número de flora microbiana.  
F  - V
6. Las infecciones asociadas al cuidado de la salud pueden ser causadas por los microorganismos ya presentes en la piel y mucosas  
F  - V
7. A mayor contacto con el paciente menor es el grado de contaminación de las manos y los posibles riesgos para la seguridad del paciente.  
F  - V





8. La presencia de dispositivos invasivos (tales como catéter urinario, catéter intravenoso, tubo endotraqueal, drenajes) aumenta el riesgo de transmisión de microorganismos.  
F  - V
9. La secuencia para la correcta técnica de higiene de manos es: frote de palma contra palma -interdigital palma contra dorso (Dedos cruzados)- interdigital palma contra palma (Dedos cruzados) - frote rotacional de pulgares – dorso de dedos en palmas opuestas (En candado) – puntas de dedos  
F  - V
10. El uso de guantes (estériles o no estériles) excluye la higiene de manos  
F  - V
11. El tiempo de higiene de manos con la aplicación y frote de alcohol glicerinado es el mismo que el lavado de manos con agua y jabón  
F  - V
12. Cuando las manos están visiblemente sucias debe intentarse primero aplicación y frote con alcohol glicerinado  
F  - V
13. Durante el lavado de manos con agua y jabón debe cerrarse el grifo del agua con la mano cuando se vaya a realizar la aplicación del jabón, con el fin de disminuir el consumo de agua de la institución  
F  - V
14. Después de realizar el secado de las manos con una toalla desechable, se puede cerrar el grifo del agua con la misma toalla  
F  - V
- Según la estrategia “Manos limpias, atención segura” se debe realizar higiene de manos en las siguientes situaciones:**
15. Antes de cambiar las sábanas sucias a un paciente que se encuentra hospitalizado  
F  - V
16. Durante la consulta médica de un paciente, después de tomar la tensión arterial y antes de continuar el examen físico general.  
F  - V
17. Después de el vaciamiento de un cistiflo  
F  - V
18. Después de la aplicación de gotas oculares  
F  - V
19. Antes de llevar al paciente a un examen en radiología  
F  - V
20. Antes de la toma de muestra de sangre para la realización de un cuadro hemático  
F  - V

