




No. Casos 14 902



Los valores de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila

Comportamiento de notificación por periodos epidemiológicos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, Colombia 2021 a semana 4 de 2026





Variación porcentual a primer período epidemiológico de 2026			
Año	Casos	Incidencia x 100 mil hab.	Variación (%) incidencia frente a 2026p.
2021	7951	15,55	79,4
2022	9605	18,60	50,0
2023	13704	26,29	6,1
2024	14149	26,89	3,8
2025	14911	28,10	-0,7
2026	14902	27,91	

No exposición 64,1 % Exposición leve 20,3 % Exposición grave 15,6 %

Incidencia de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

Incidencia de casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia por 100.000 habitantes a periodo epidemiológico I 2026

Casos e incidencia de municipios/distritos que aportan el 42,4 % de casos de APTR, Colombia a periodo epidemiológico I 2026



Municipio/Distrito	Casos	%	Incidencia * 100000 hab
Bogotá, D.C.	1978	13,3	24,89
Medellín	559	3,8	22,12
Cali	437	2,9	19,25
Barranquilla	380	2,5	29,78
Neiva	217	1,5	53,16
Cúcuta	216	1,4	27,27
Soacha	213	1,4	23,78
Cartagena	209	1,4	20,67
Ibagué	206	1,4	36,96
Pereira	203	1,4	41,61
Villavicencio	189	1,3	32,11
Pasto	188	1,3	46,45
Santa Marta	160	1,1	27,18
Popayán	159	1,1	44,74
Soledad	147	1,0	20,04
Bucaramanga	142	1,0	22,96
Montería	122	0,8	20,85
Armenia	118	0,8	38,42
Manizales	110	0,7	23,12
Palmira	106	0,7	27,70
Bello	93	0,6	15,27
Tunja	83	0,6	43,37
Dosquebradas	77	0,5	31,25

Incidenias más altas por 100.000 habitantes en municipios con menos de 20.000 habitantes

Municipio	ET	Incidenia
Manta	Cundinamarca	233,92
Sativanorte	Boyacá	197,04
Nariño	Nariño	175,82
Carmen de Apicalá	Tolima	144,26
Zipacón	Cundinamarca	129,06
Carolina	Antioquia	127,16
Agua de Dios	Cundinamarca	126,93
Viotá	Cundinamarca	125,96
Génova	Quindio	116,97
Olaya	Antioquia	114,42

Incidenias más altas por 100.000 habitantes en municipios con 20.000 a 100.000 habitantes

Municipio	ET	Incidenia
Sandoná	Nariño	115,53
Moniquirá	Boyacá	104,42
Rivera	Huila	98,16
Chinácota	Norte de Santander	96,93
Restrepo	Meta	96,11
Silvania	Cundinamarca	93,08
El Colegio	Cundinamarca	91,28
Acevedo	Huila	83,71
Flandes	Tolima	78,89
San Martín	Meta	77,11

Incidenias más altas por 100.000 habitantes en municipios con más de 100.000 habitantes

Municipio	ET	Incidenia
Girardot	Cundinamarca	63,26
Neiva	Huila	53,16
Yumbo	Valle del Cauca	52,74
Ipiales	Nariño	52,14
Pasto	Nariño	46,45
Popayán	Cauca	44,74
Fusagasugá	Cundinamarca	43,60
Tunja	Boyacá	43,37
Duitama	Boyacá	42,20
Pereira	Risaralda	41,61




No. Casos 14 902



Los valores de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila

Comportamientos Inusuales de agresiones y contactos con animales potencialmente transmisores de la rabia, Colombia, a período Epidemiológico I 2026



EAPB que aportan el 75,5 % de casos de agresiones para 2026, Colombia a período epidemiológico I de 2026 y comparado con 2025


Aseguradora	2025	2026	%	Diferencia (%)
Nueva EPS SA Subsidiado	1287	1376	9,2	0,05
Sanitas EPS SA	1246	1292	8,7	6,92
Sura EPS	1283	1250	8,4	3,69
Salud Total SA EPS	999	1019	6,8	2,57
Nueva EPS	724	737	4,9	2,00
Famisanar EPS LTDA	626	651	4,4	1,80
Nueva EPS Contributivo	691	643	4,3	3,99
Nueva EPSS	681	629	4,2	6,95
Coosalud ESS EPS-S	625	627	4,2	7,64
Compensar EPS	603	520	3,5	0,32
EMSSANAR ESS	492	502	3,4	13,76
EPS Sanitas SA - CM	455	444	3,0	2,03
Salud Total SA Subsidiado	428	434	2,9	2,42
Mutual Ser ESS	476	420	2,8	1,40
Asmet Salud ESS	408	390	2,6	11,76
Savia Salud	301	317	2,1	4,41

Aumento Disminución





Análisis de persona de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

Variación porcentual con 2025

Aumento Disminución



Distribución porcentual por edad y sexo, periodo epidemiológico I Colombia 2026





No. Casos 14 902



Los valores de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila

Características de las agresiones y contactos por animales potencialmente transmisores de rabia

Variación porcentual con 2025: Aumento ● Disminución ●

Variación porcentual de criterios de riesgo de adquirir rabia humana a semana 4 de 2026 comparado con 2025

Mayor riesgo		Zona anatómica de exposición	Menor riesgo	
Casos (%)	%		Casos (%)	%
Cabeza/cuello 2 018 (13,5 %)	0,3		Miembro superior 2 533 (17,0 %)	5,4
Manos 3 645 (24,5 %)	0,9		Tronco 429 (2,9 %)	5,3
Genitales 82 (0,6 %)	0,0		Miembro inferior 6 225 (41,8 %)	1,4
Pies 722 (4,8 %)	2,4			

Característica de lesión		
Lesión	Casos (%)	%
Múltiple	3 683 (24,7 %)	4,1
Profunda	2 054 (13,8 %)	1,4


Estado animal compañía		
Perro/Gato	Casos (%)	%
Signología rábica	41 (0,3 %)	31,7
Muerte	107 (0,7 %)	19,5

Lavado de herida y arañazo en agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia a semana epidemiológica 4

2025	2026	Situación	p
14 574	14 547	Estable	0,4840


Sutura de herida profundas a semana epidemiológica 4

2025	2026	Situación	p
971	923	Estable	0,2864



Porcentaje y casos de especies agresoras a semana epidemiológica (SE) 4 de 2026

Perros 82,3 % 12 262 casos	Gatos 16,1 % 2 402 casos	Silvestres 1,1 % 165 casos	Producción 0,5 % 73 casos
2,5 %	14,1 %	7,8 %	9,9 %



Casos de provocación de agresión a semana epidemiológica 4 de 2026

2 751 casos 916 casos 45 casos 22 casos

Variación de provocación con 2025

13,4 %	10,5 %	25,0 %	29,4 %
--------	--------	--------	--------

Antecedente vacuna perros y gatos a semana epidemiológica 4 de 2026

4 500 casos 847 casos

Variación de vacunación de perros y gatos con 2025

5,5 %	14,8 %
-------	--------

Indicadores de vigilancia de rabia humana y agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

Incidencia de agresiones por
100 000 habitantes

27,91

Proporción de Incidencia de rabia
humana por 1 000 000 hab.

0,00

Proporción de pacientes
expuestos al virus de la
rabia

34,4 %

Proporción casos con
exposición grave al virus de
la rabia

43,1 %

Proporción casos con
exposición leve al virus de la
rabia

56,9 %

0

18



Rabia humana

Sin casos confirmados
ni probables del
evento

Casos notificados de
forma errónea,
realmente corresponden
a APTR







No. Casos 14 902





Los valores de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila

Proporción de casos que cumplen la clasificación de exposición grave a semana epidemiológica 4 de 2026



Proporción de casos que cumplen la clasificación de exposición leve a semana epidemiológica 4 de 2026




Indicadores de vigilancia de clasificación adecuada de no exposición, exposición leve y exposición grave por departamentos y distritos a semana epidemiológica 4 de 2026

Dirección territorial	Indicador grave	Indicador leve	Indicador no expo
Amazonas	81,8	36,4	100,0
Antioquia	96,3	70,9	97,6
Arauca	62,5	52,6	100,0
Atlántico	77,8	58,5	96,9
Barranquilla	98,4	78,6	99,6
Bogotá	93,8	89,1	99,4
Bolívar	90,9	52,6	98,4
Boyacá	97,1	80,0	98,4
Buenaventura	NA	50,0	100,0
Caldas	89,7	66,7	97,9
Cali	82,5	54,8	98,6
Caquetá	100,0	88,2	100,0
Cartagena	95,0	80,0	98,2
Casanare	100,0	47,1	96,5
Cauca	86,9	60,7	99,6
Cesar	100,0	86,4	100,0
Chocó	100,0	33,3	100,0
Córdoba	95,8	79,3	98,1
Cundinamarca	95,6	72,9	98,5
Guainía	100,0	40,0	100,0
Guaviare	100,0	83,3	100,0
Huila	83,6	63,7	98,4
La Guajira	81,0	32,1	98,9
Magdalena	82,4	50,0	97,8
Meta	95,2	79,6	98,3
Nariño	94,1	75,2	99,1
Norte Santander	95,3	79,5	98,7
Putumayo	100,0	90,0	100,0
Quindío	97,0	79,1	100,0
Risaralda	80,8	57,4	94,0
San Andrés	0,0	100,0	94,4
Santa Marta	96,2	53,8	100,0
Santander	95,2	67,5	98,5
Sucre	92,3	31,1	94,1
Tolima	89,2	85,9	98,1
Valle	97,1	89,4	99,4
Vaupés	75,0	100,0	100,0
Vichada	66,7	60,0	100,0
Nacional	92,6	73,1	98,4

Manejo biológico de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia a semana 4 de 2026

Clasificación de las agresiones e indicación de manejo biológico, a período epidemiológico I 2026

Tipo Exposición	Vacuna				Inmunoglobulina			
	Si	%	No	%	Si	%	No	%
No exposición	86	0,9	9684	99,1	23	0,2	9747	99,8
Exposición Leve	2758	94,5	162	5,5	68	2,3	2852	97,7
Exposición Grave	2181	98,6	30	1,4	2102	95,1	109	4,9



INFOGRAFÍA DE EVENTO

Vigilancia de la rabia humana y agresiones por animales potencialmente transmisores de la rabia

Período epidemiológico

I 2026

31/01/2026



No. Casos 14 902



Los valores de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila

Porcentajes altos de entidades territoriales con indicación inadecuada de biológicos sobre total de casos notificados por tipo de exposición, Colombia, a periodo epidemiológico I de 2026

No Exposición						Exposición leve						Exposición grave					
Con orden vacuna			Con orden Ig			Sin orden vacuna			Con orden Ig			Sin orden vacuna			Sin orden Ig		
ET	Casos	%	ET	Casos	%	ET	Casos	%	ET	Casos	%	ET	Casos	%	ET	Casos	%
Chocó	2	13,3%	Chocó	3	20,0%	Chocó	2	22,2%	Guainía	2	40,0%	Arauca	5	31,3%	Arauca	5	31,3%
Cartagena	7	4,1%	Bolívar	2	1,1%	Sucre	10	22,2%	Arauca	3	15,8%	Cali	9	9,3%	Huila	20	27,4%
Atlántico	7	2,7%	Atlántico	2	0,8%	Guainía	1	20,0%	Bolívar	2	10,5%	Cauca	5	8,2%	Sucre	2	15,4%
La Guajira	2	2,2%	Magdalena	1	0,7%	Magdalena	2	20,0%	Santander	13	10,3%	Córdoba	2	4,2%	Barranquilla	9	14,5%
Bolívar	3	1,6%	Córdoba	2	0,6%	Santa Marta	7	17,9%	Magdalena	1	10,0%	Santa Marta	1	3,8%	Cali	10	10,3%
Huila	5	1,6%	Cartagena	1	0,6%	Atlántico	7	17,1%	Amazonas	1	9,1%	Meta	2	3,2%	Cauca	5	8,2%
Cauca	4	1,5%	Santander	2	0,4%	Antioquia	24	13,4%	Cartagena	2	8,0%	Risaralda	2	2,6%	Caldas	4	6,9%
Barranquilla	4	1,5%	Antioquia	5	0,4%	Risaralda	8	11,8%	Atlántico	3	7,3%	Tolima	2	2,4%	Casanare	2	6,5%
Antioquia	18	1,5%	Huila	1	0,3%	Bolívar	2	10,5%	Cesar	1	4,5%	Nariño	1	2,0%	Córdoba	3	6,3%

Porcentaje de orden inadecuada de aplicación vacuna y suero según clasificación de exposición por entidad territorial de notificación, Colombia, semana epidemiológica 4 de 2026

Entidad Territorial	Orden de aplicación de Vacuna			Orden de aplicación de suero antirrábico		
	No Expo	Expo Leve	Expo Grave	No Expo	Expo Leve	Expo Grave
	Sí	No	No	Sí	Sí	No
	%	%	%	%	%	%
Amazonas	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0
Antioquia	1,5	13,4	0,0	0,4	1,7	2,8
Arauca	0,0	5,3	31,3	0,0	15,8	31,3
Atlántico	2,7	17,1	0,0	0,8	7,3	5,6
Barranquilla	1,5	3,6	0,0	0,0	3,6	14,5
Bogotá	0,6	1,5	0,0	0,2	0,7	3,3
Bolívar	1,6	10,5	0,0	1,1	10,5	0,0
Boyacá	1,3	4,3	0,0	0,0	0,7	0,0
Buenaventura	0,0	0,0	NA	0,0	0,0	NA
Caldas	0,5	4,9	0,0	0,0	1,2	6,9
Cali	0,0	9,7	9,3	0,0	3,2	10,3
Caquetá	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Cartagena	4,1	0,0	0,0	0,6	8,0	5,0
Casanare	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	6,5
Cauca	1,5	8,7	8,2	0,0	0,7	8,2
Cesar	0,6	0,0	0,0	0,0	4,5	5,6
Chocó	13,3	22,2	0,0	20,0	0,0	0,0
Córdoba	1,3	6,9	4,2	0,6	3,4	6,3
Cundinamarca	0,6	5,8	0,6	0,2	2,7	5,0
Guainía	0,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Guaviare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Huila	1,6	3,5	0,0	0,3	2,5	27,4
La Guajira	2,2	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdalena	0,7	20,0	0,0	0,7	10,0	5,9
Meta	0,0	5,6	3,2	0,0	0,0	4,8
Nariño	0,3	4,2	2,0	0,0	0,9	3,9
Norte Santander	0,3	0,9	0,0	0,0	0,9	1,9
Putumayo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
Quindío	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Risaralda	0,4	11,8	2,6	0,0	4,4	2,6
San Andrés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Santa Marta	1,0	17,9	3,8	0,0	2,6	3,8
Santander	0,6	7,9	0,0	0,4	10,3	0,0
Sucre	0,6	22,2	0,0	0,0	4,4	15,4
Tolima	0,5	2,2	2,4	0,0	3,3	3,6
Valle del Cauca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Vaupés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vichada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INFOGRAFÍA DE EVENTO

Vigilancia de la rabia humana y agresiones por animales potencialmente transmisores de la rabia

Período epidemiológico

I 2026

31/01/2026



No. Casos 14 902



Los valores de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila

Agresiones por animales potencialmente transmisores de la rabia y rabia humana

Se realizó análisis descriptivo, retrospectivo a partir de la información captada en el Sistema de Información de Vigilancia Nacional, Sivigila individual, de los casos notificados de agresiones por animales potencialmente transmisores de la rabia (APTR) y rabia humana (códigos 300 y 670). Se analizaron los casos en tiempo, lugar y persona y se realizó un análisis de indicadores conforme con lo establecido en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública del evento.

Comportamiento de la notificación: se describen los casos de APTR notificados hasta **período epidemiológico I** de 2026; se presenta la tendencia por período epidemiológico desde 2021 a través de una gráfica con la clasificación de exposición. Se determinó la variación porcentual acumulado de casos con los cinco años anteriores. Se construyeron mapas de incidencias de casos por direcciones territoriales de salud del orden departamental/ distrital y municipal por cuartiles y se calculó el porcentaje de municipios y distritos que aportan el **42,4 %** de la notificación. Se presentó las mayores incidencias en municipios y distritos de acuerdo a la población (<20.000, 20.000 a 100.000 y >100.000 habitantes).

Comportamientos inusuales: se realiza la metodología MMWR para departamentos y distritos, y MMWR y distribución de Poisson para distritos y municipios. MMWR compara del valor observado (casos notificados en el momento actual) con una línea de base que está conformada por los datos históricos del evento en 15 intervalos de tiempo de 5 años, estos intervalos comprenden los casos de los períodos (4 semanas) inmediatamente anterior, central (incluyendo la actual) y posterior; siendo necesario calcular promedio, desviación estándar, razón de los observado – esperado, coeficiente de variación, límite inferior y superior de este histórico. Si la razón es inferior al límite inferior, si es mayor al límite superior se identifica un comportamiento inusual significativo; si se encuentra entre los límites se interpreta como estable. El periodo de comparación fue 2021 – 2025. Se determinó las empresas administradoras de planes de beneficios que aportan el **75,5 %** de la notificación de 2026 y se compararon con los casos de 2025.

Comportamiento de variables sociodemográficas: se construyó una pirámide poblacional, y se compararon con 2025 las variables de sexo, nacionalidad, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pertenencia étnica, estrato, empresa administradora de planes de beneficios (EAPB).

Análisis del comportamiento variables complementarias: se realizó análisis de frecuencia de la distribución de la variable clasificación de la exposición respecto a la solicitud de aplicación de vacuna e inmunoglobulina, este mismo análisis se presenta por entidad territorial de notificación de los casos (para este análisis se realizó clasificación del riesgo, mediante semaforización para identificar entidades territoriales críticas en el cumplimiento de tratamiento específico). Se presentó la variación porcentual con el año anterior de los criterios de riesgo de adquirir rabia humana como ubicación anatómica de la lesión, las características de herida como profundidad y multiplicidad, y el estado signología o muerte del animal agresor perro y gato. Se comparó la variable de lavado de herida y sutura de la herida con el año anterior, así como la clasificación del animal agresor, si la agresión es provocada y el antecedente vacunal de perros y gatos.

Análisis de indicadores: este análisis se realizó conforme a lo dispuesto en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública del evento, como se describe a continuación:

Proporción de incidencia rabia humana: (total de casos nuevos notificados / población total proyectada DANE) * 100.000

Proporción de Incidencia agresiones por animales potencialmente transmisores de la rabia: (total de casos nuevos notificados / población total proyectada DANE) * 100.000

Proporción de pacientes expuestos a la rabia: (total de casos nuevos expuestos al virus de la rabia / total de casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de la rabia) * 100

Proporción de casos exposición leve: (total de casos clasificados como exposición leve/ total de casos nuevos expuestos al virus de la rabia)*100.

Proporción de casos exposición grave: (total de casos clasificados como exposición grave/ total de casos nuevos expuestos al virus de la rabia)*100.

Proporción de casos que cumplen la definición de caso de No exposición: (total de casos adecuadamente clasificados como no exposición/ total de casos notificados como no exposición) *100.

Proporción de casos que cumplen la clasificación de exposición leve: (total de casos adecuadamente clasificados como exposición leve/ total de casos notificados como exposición leve) *100.

Proporción de casos que cumplen la clasificación de exposición grave: (total de casos adecuadamente clasificados como exposición grave/ total de casos notificados como exposición grave) *100. Los dos últimos se presentan en mapas, por departamentos/ distritos y por municipios.

Se presenta el manejo biológicos asertivo dado en las diferentes clasificaciones de exposición por vacuna e inmunoglobulina, presentando los porcentajes más altos de no concordancia con lo esperado.

* Poblaciones DANE: actualización de 2026 con base en el CNPV 2018.

José Leonardo Gómez Gómez

jgomezg@ins.gov.co

Grupo de Vigilancia y Control de Enfermedades Transmisibles Endoepidémicas y Relacionadas con Salud Sexual
Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública

Instituto Nacional de Salud

Correo electrónico: contactenos@ins.gov.co

Teléfono: (1) 220 77 00 Ext.

Bogotá, Colombia

www.ins.gov.co

Línea gratuita nacional: 01 8000 113 400