

Esquema Completo de Vacunación



vacúnate
y se un vacar

Edad	Vacuna	Dosis	Enfermedad que previene
Recién nacido	BCG Hepatitis B	Única Recién Nacido	Meningitis tuberculosa Hepatitis B (garantizar en las primeras 12 horas del RN)
A los 2 meses	Pentavalente (DPT-Hib-Hep B) Antipolio Inactivo (VIP) Rotavirus Neumococo Conjugado	Primera Primera Primera Primera	Difteria- Toserferina- Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b. Hepatitis B Parálisis flácida asociada a Poliomieltitis Gastroenteritis asociadas al Rotavirus Infecciones respiratorias asociadas a Streptococcus pneumoniae (neumonía, otitis, meningitis y bacteriemias)
A los 4 meses	Pentavalente (DPT-Hib-Hep B) Antipolio Inactivo (VIP) Rotavirus Neumococo Conjugado	Segunda Segunda Segunda Segunda	Difteria- Toserferina-Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b. Hepatitis B Parálisis flácida asociada a Poliomieltitis Gastroenteritis asociadas al Rotavirus Infecciones respiratorias asociadas a Streptococcus pneumoniae (neumonía, otitis, meningitis y bacteriemias)
A los 6 meses de edad	Pentavalente (DPT-Hib-Hep B) Antipolio Inactivo (VIP) Influenza estacional	Tercera Tercera Primera	Difteria- Toserferina-Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b. Hepatitis B Parálisis flácida asociada a Poliomieltitis Enfermedades respiratorias causadas por el virus de la influenza
7 meses	Influenza estacional	Segunda	Enfermedades respiratorias causadas por el virus de la influenza
9 meses	Fiebre amarilla	Única	Fiebre amarilla
A los 12 meses	Triple viral Varicela Neumococo Conjugado Hepatitis A	Primera Primera Refuerzo Única	Sarampión, Rubéola y Paperas Varicela Infecciones respiratorias asociadas a Streptococcus pneumoniae (neumonía, otitis, meningitis y bacteriemias) Hepatitis A
A los 18 meses	Pentavalente (DPT-Hib-Hep B) Antipolio Inactivo (VIP) Triple viral	Primer Refuerzo Primer refuerzo Refuerzo	Difteria- Toserferina-Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b. Hepatitis B Parálisis flácida asociada a Poliomieltitis Sarampión, Rubéola y Paperas

Edad	Vacuna	Dosis	Enfermedad que previene
A los 5 años	DPT Antipolio Inactivo (VIP) Varicela	2do refuerzo 2do refuerzo Refuerzo	Difteria-Toserferina-Tétanos Parálisis flácida asociada a Poliomieltitis Varicela
9 a 17 años	Virus del Papiloma Humano (VPH) en niñas, niños y adolescentes	Única	Cánceres asociados al Virus del Papiloma Humano y otras infecciones
Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años. Toxóide tetánico y diftérico del adulto (Td)		5 dosis: Td1: Día 0 Td2: al mes de d1 Td3: a los 6 meses de Td2 Td4: al año de Td3 Td5: al año de Td4 Refuerzo cada 10 años	Difteria, Tétanos neonatal
Gestantes	Influenza estacional Tdap (Tétanos, Difteria, Tos Ferina acelar)	Única anual a partir de la semana 14 Única por cada gestación. Entre la semana 26 y preferiblemente antes de la semana 36	Enfermedades respiratorias asociadas al virus de la influenza Tétanos neonatal, difteria y Tos ferina neonatal
Adultos de 60 años y +	Influenza estacional Neumococo polisacárido	Anual Única	Enfermedades respiratorias asociadas al virus de la influenza Enfermedades causadas por la bacteria Streptococcus pneumoniae

¡Ante la presencia de brotes el esquema infantil y para gestantes se adelantó de manera temporal!

Las vacunas que anteriormente se aplicaban a los:

- 2 meses ahora se administrarán a los **6 meses**.
- 4 meses, se administra a los **3 meses**.
- 6 meses, se administra a los **4 meses y medio**.

Se mantiene el refuerzo con pentavalente a los 18 meses y a los 5 años con DPT.

• Vacuna Tdap para gestantes desde la **semana 20**.

