

Vacunar
es
cuidar

Reacciones adversas de la vacuna antirrábica para perros y gatos.



Las reacciones adversas o efectos secundarios en perros y gatos a la vacuna antirrábica pueden ser de aparición inmediata, de 24 a 36 horas después de que sea aplicado el biológico o de desarrollo crónico.


La vacuna antirrábica ha demostrado ser de las más seguras, generando muy pocas reacciones adversas.




¿Cuáles son las reacciones adversas más comunes y esperadas?



Inflamación, dolor, endurecimiento o tumefacción de la piel en la zona donde fue administrada la vacuna (puede presentarse en 30 minutos y hasta una semana posterior a la aplicación).



Si la zona continúa aumentada de tamaño por más de 2 semanas y no genera dolor ni malestar, para favorecer su desaparición se recomienda aplicar compresas con agua tibia en la zona por unos 10 a 15 minutos, dos veces al día.



Fiebre, apatía o aumento de tamaño de ganglios linfáticos. El animal puede mostrarse apático o aletargado (como adormecido) durante las 24 horas siguientes a la aplicación de la vacuna o presentar un cuadro leve de vómito o diarrea. **Estos síntomas suelen desaparecer en cuestión de horas.**

¿Cuáles son las reacciones adversas indeseadas?

Edema (hinchazón) en párpados, hocico o nariz, prurito (picazón) generalizados, vómito, diarrea o convulsiones.



¿Qué debo hacer?

Si su perro o gato presenta alguna reacción o efecto adverso, **¡NO LE ADMINISTRE NINGUN MEDICAMENTO!** consulte a su médico veterinario de confianza.

Para mayor información, puede comunicarse con la **Secretaría Distrital de Salud** al teléfono **3649090 Ext 9535**, o al correo **vacunarabianimal@saludcapital.gov.co**



Esta información hace referencia únicamente a la vacuna antirrábica para perros y gatos administrada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

FUENTES

Bobadilla, Joaquín y col. Guías de Vacunación para perros y gatos COLAVAC-FIIVAC-México