
Estadio postintubación orotraqueal
PaO2/FiO2 <150 Presión meseta >30 cmH2O
Si
No
Sedación Profunda RASS -3 a -5
Sedación Consciente RASS 0 a -2
Asincronía PaO2/FiO2 <150 P Meseta >30cmH2O
Asincronía Deterioro Oxigenación Deterioro Mecánica
No
Si
No
Si
Monitoría Dolor Agitación Sincronía
Relajación Neuromuscular Bolos#2
Monitoría Dolor Agitación Sincronía
Dolor
Delirium
Patrón respiratorio
Mejoría PMeseta Pao2/FiO2
Dosis máxima de analgésicos
Dosis máxima sedante
Evaluar DOLOR
Si
No
Si
No
No
Si
Evaluar DELIRIUM
Infusión Relajante Neuromuscular
Considerar Ketamina Dexmedetomidina Metadona Cambio de opioide
Bolos Ajuste de infusión
Bolos Ajuste de infusión
Evaluar otras causas
Evaluar Mecánica Pulmonar
Monitoría TOF BIS
Logro meta
Logro de meta
Considerar Adición otro sedante Anti psicótico Acido Valproico
Seguimineto escalas BPS CPOT
Si
No
Seguimiento Escalas RASS CAM ICU
Considerar Adición otro sedante Anti psicótico Acido Valproico